Dr. Schumacher

weita
Weiter denken.
Nachhaltig handeln.

SORTIMENTSÜBERSICHT DESINFEKTION

DIE WEITA AG ist ein führender Schweizer Anbieter von Verbrauchsmaterialien und den damit verbundenen Dienstleistungen für Industrie, Gastronomie-Grosshandel, Gewerbe, Reinigung, Medizin sowie der öffentlichen Hand.
Als Schnittstelle zwischen Produzenten und Kunde vereinfachen wir die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien – und sind universeller Ansprechpartner für Ihre individuellen Bedürfnisse. Hierbei arbeiten wir mit verschiedenen, verlässlichen Experten und Partnern zusammen und wählen diese nach hohen Ansprüchen aus. Dieser Prozess ist kontinuerlich und wird gewissenhaft und mit grosser Sorgfalt von unseren Experten vorangetrieben.

SEIT 2003 besteht die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen Dr. Schumacher GmbH und der WEITA AG - Dr. Schumacher als innovativer Hersteller im Bereich Desinfektion & Hygiene und WEITA als Handelspartner in der Schweiz.

DR. SCHUMACHER beschäftigt 1’850 Mitarbeiter an neun Standorten weltweit. Der Hauptsitz der Dr. Schumacher GmbH mit der Produktionsstätte für Desinfektionsmittel in flüssiger Form liegt im hessischen Malsfeld-Beiseförth. Die Produktionsstätte in Luban, Polen, ist für die Herstellung von trockenen und getränkten Vliestücher zuständig. Weitere Tochterunternehmen und Vertriebsstandorte gibt es in Österreich, der Schweiz, Portugal, der Türkei, Jordanien und Indien.
Ein Netzwerk von Distributionspartnern in rund 70 Ländern unterstreicht die internationale Ausrichtung des Unternehmens.

«Dr. Schumacher & Weita – eine Partnerschaft mit Qualitätssiegel»

Dr.
Schumacher

Dr. Schumacher Hygienelevel

Alle Viruswirksamkeiten farblich codiert

Nicht erst seit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 gehören Viren zu denjenigen Pathogenen, die vor allem bei älteren und immungeschwächten Menschen schwerwiegende Erkrankungen auslösen können. Rund 85 % der nosokomialen Ausbrüche in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen werden durch virale Erreger hervorgerufen[1].

Viren lassen sich nach ihrem Aufbau in zwei Kategorien einteilen: in Viren mit und ohne Hülle. Behüllte Viren wie z.B. Corona-, HIV- und Influenzaviren bieten chemischen Substanzen eine gute Angriffsfläche und sind daher leicht zu inaktivieren. Hüllenlose Viren wie z. B. Noro- oder Coxsackieviren sind stabiler gegenüber Desinfektionsmitteln. Die unbehüllten Noro-, Rota- und Adenoviren sind besonders häufig für Ausbrüche verantwortlich. 74 % aller nosokomialen Ausbrüche werden allein durch Noroviren hervorgerufen[1]. Diese Viren sind stabiler als behüllte Viren, aber nicht so stabil wie einige andere unbehüllte Viren.

Den unterschiedlichen Widerstandsfähigkeiten von Viren entsprechen drei Wirkungsspektren von Desinfektionsmitteln, die nach den Methoden von RKI/DVV bzw. nach DIN EN geprüft werden: Begrenzt viruzid, begrenzt viruzid PLUS und viruzid.

Die farbliche Codierung der Hygienelevel **PREVENT :: PRESERVE :: PROTECT** spiegelt die drei Wirkungsspektren wider. So erkennen Anwender auf den ersten Blick die jeweilige Viruswirksamkeit der meisten Dr. Schumacher Produkte.

Erfahren Sie mehr:
www.schumacher-online.com/de/einfach

Quelle:
[1] Robert Koch-Institut. Nosokomiale Ausbrüche. Stand: 07.12.2016. https://bit.ly/2VfepMo

PREVENT LEVEL

Wirkungsspektrum:
Bakterizid, levurozid, **begrenzt viruzid***

Behüllte Viren sind von einer Lipidhülle umgeben. Die Virushülle bietet einen Angriffspunkt und kann durch Desinfektionsmittel leicht zerstört werden. Dazu reicht ein Wirkungsspektrum begrenzt viruzid aus. Viele behüllte Viren sind von hoher klinischer Relevanz.
Relevante Viren: HBV, HCV und HIV, Corona- sowie Influenzaviren.

PRESERVE LEVEL

Wirkungsspektrum:
Bakterizid, levurozid, **begrenzt viruzid PLUS***

Hüllenlose Viren sind grundsätzlich stabiler als behüllte Viren. Innerhalb dieser Gruppe gibt es jedoch einige Viren, die nicht so widerstandsfähig sind wie andere unbehüllte Viren. Klinisch relevant sind dabei Noro-, Rota und Adenoviren, die für eine Vielzahl an Ausbrüchen verantwortlich sind. Da eine viruzide Wirksamkeit hier nicht erforderlich und grundsätzlich auch schwieriger zu erzielen ist, wurde das Wirkungsspektrum begrenzt viruzid PLUS eingeführt.
Relevante Viren: Alle behüllten Viren sowie Noro-, Rota- & Adenoviren.

PROTECT LEVEL

Wirkungsspektrum:
Bakterizid, levurozid, **viruzid***

Bei unbehüllten Viren mit hoher Widerstandsfähigkeit können hochwirksame Wirkstoffe, höhere Desinfektionsmittelkonzentrationen und längere Einwirkzeiten erforderlich sein. Das Wirkungsspektrum von Produkten gegenüber diesen Viren entspricht der Kategorie viruzid und schließt eine begrenzt viruzide Aktivität und eine begrenzt viruzid PLUS Aktivität ein.
Relevante Viren: ECHO-, Coxsackie-, Rhino-, Picorna- und Papillomviren.

* **begrenzt viruzid:** alle behüllten Viren
begrenzt viruzid PLUS: alle behüllten Viren, zusätzlich Noro, Rota- und Adenoviren
viruzid: alle behüllten und unbehüllten Viren

Anwendungsbezogen können weitere Wirkspektren (sporizid, fungizid, tuberkulozid, mykobakterizid) in der **Prevent :: Preserve :: Protect** Anwendungsempfehlung berücksichtigt sein.

HÄNDE- UND HAUTDESINFEKTION

ALLGEMEINE INFORMATIONEN					
Artikelname	**ASEPTOMAN® PERFUME FREE** (Nachfolger von Aseptoman PUR)	**ASEPTOMAN® MED** (Nachfolger von Aseptoman)	**ASEPTOMAN® FORTE** (Nachfolger von Aseptoman PLUS)	**ASEPTOMAN® GEL** (Nachfolger von Aseptoman GEL)	**ASEPTODERM®** (Nachfolger von Aseptoskin)
Bild					
Hygienelevel	**PREVENT LEVEL**	**PRESERVE LEVEL**	**PROTECT LEVEL**	**PROTECT LEVEL**	N/A
Artikelnummer	00-4030P-0015E6 (150ml) 00-4030P-005E6 (500ml) 00-4030P-010E6 (1L)	00-4570P-0015 (150ml) 00-4570P-005 (500ml) 00-4570P-010 (1L) 00-4570P-050 (5L)	00-4850P-0015 (150ml) 00-4850P-005 (500ml) 00-4850P-010 (1L) 00-4850P-050 (5L)	00-409-0015 (150ml) 00-409-005 (500ml) 00-409-010 (1L)	00-501-0025E6 (250ml) 00-501-010E6 (1L)
Zusammensetzung	100 g Lösung enthalten: 63,14g 2-Propanol	100 g Lösung enthalten: 65g Ethanol	100 g Lösung enthalten: 85g Ethanol	100 g Lösung enthalten: 80,8g Ethanol	100 g Lösung enthalten: 63,1g 2-Propanol, Duftstoffe
Produktstatus	Biozid	Biozid	Biozid	Biozid	Biozid
WIRKUNGSSPEKTRUM & EINWIRKZEITEN					
Hyg. Händedesinfektion gemäss EN 1500	✓ (30 s.)	✓(30 s.)	✓(30 s.)	✓ (30 s.)	-
Chirurg. Händedesinfektion gemäss EN 12791	✓ (1,5 min)	✓(2 min)	✓ (1,5 min)	✓ (1,5 min)	-
Hautdesinfektion EN 12791	-	-	-	-	✓ (1,5 min)
Begrenzt viruzid EN 14476 (Behüllte Viren z.B. HBV, HCV, Influenza)	✓ (30 s.)	✓ (15 s.)	-	-	✓ (15 s.)
Wirksam gegen Coronaviren EN 14476	✓ (30 s.)	✓ (30 s.)	✓ (15 s.)	✓ (15 s.)	✓ (15 s.)
Begrenzt viruzid PLUS EN 14476 (Behüllte Viren + Rota, Adeno- und Noroviren)	-	✓ (30 s.)	✓ (30 s.)	✓ Adenoviren: 1 min; Noroviren: 15 s.	-

Wirksam gegen Rotaviren EN 14476	✓ (15 s.)	✓ (30 s.)	✓ (30 s.)	-	-
Viruzid EN 14476 (Behüllte und unbehüllte Viren)	-	-	✓ (1 min.)	✓ (1 min)	-
Wirksam gegen Polioviren EN 14476	-	-	✓ (1 min.)	✓ (1 min)	-
Bakterizid EN 13727	✓ (15 s.)	✓ (30 s.)	✓ (15 s.)	✓ (15 s.)	✓ (15 s.)
Levurozid EN 13624	✓ (15 s.)	✓ (30 s.)	✓ (15 s.)	✓ (5 s.)	✓ (15 s.)
Tuberkulozid EN 14348	✓ (15 s.)	✓ (30 s.)	✓ (30 s.)	✓ (30 s.)	✓ (30 s.)
Fungizid EN 13624	-	-	✓ niedrige Belastung: 1,5 min; hohe Belastung: 2 min	-	-
PRODUKTEIGENSCHAFTEN					
Rückfettend	✓	✓	✓	✓	N/A
Parfümfrei	✓	✓	✓	✓	N/A
Farbstofffrei	✓	✓	✓	✓	✓
EINSATZBEREICH					
Anwendungsgebiete	Hygienische und chirurgische Händedesinfektion.	Hygienische und chirurgische Händedesinfektion.	Hygienische und chirurgische Händedesinfektion.	Hygienische und chirurgische Händedesinfektion.	Hautdesinfektion vor Operationen, Inzisionen, Punktionen und Injektionnen.
Empfehlungsbereich					
Wo genau?	Wartebereich, Sprechzimmer, Eingangsbereich, etc.	Wartebereich, Sprechzimmer, Eingangsbereich, etc.	Intensivstation & Isolationszimmer	Intensivstation & Isolationszimmer	Sprechzimmer & OP-Saal

FLÄCHENDESINFEKTION

Dr. Schumacher

ALLGEMEINE INFORMATIONEN				
Artikelname	**DESCOSEPT SPEZIAL**	**DESCOSEPT SENSITIVE**	**CLEANISEPT WIPES MAXI**	**DESCOSEPT SENSITIVE WIPES**
Bild				
Hygienelevel	**PREVENT LEVEL**	**PRESERVE LEVEL**	**PREVENT LEVEL**	**PRESERVE LEVEL**
Artikelnummer	00-208-010E5 (1L) 00-208-050E5 (5L)	00-323DS-005E5 (500ml) 00-323DS-0075-02E5 (750ml) 00-323DS-010E5 (1L) 00-323DS-050E5 (5L) 00-323DS-100E5 (10L)	00-208-T100E5 (Beutel à 100 Tücher)	00-323DS-T060E5 (Beutel à 60 Tücher)
Zusammensetzung	100 g Lösung enthalten: 0,50 g Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid, 0,25 g Didecyldimethylammoniumchlorid	100 g Lösung enthalten: 45 g Ethanol	100 g Lösung enthalten: 0,50 g Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid, 0,25 g Didecyldimethylammoniumchlorid	100 g Lösung enthalten: 45 g Ethanol
Tuchgrösse	-	-	20 x 22 cm	20 x 22 cm
Produktstatus	Medizinprodukt Klasse IIa gemäss MDD/MDR	Medizinprodukt Klasse IIa gemäss MDD/MDR	Medizinprodukt Klasse IIa gemäss MDD/MDR	Medizinprodukt Klasse IIa gemäss MDD/MDR
WIRKUNGSSPEKTRUM & EINWIRKZEITEN				
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion: Bakterizid, levurozid EN 16615	✓ (1 min)	✓ (2 min)	✓ (1 min)	✓ (2 min)
Begrenzt viruzid EN 14476 (Behüllte Viren z.B. HBV, HCV, Influenza)	✓(30 s.)	✓ (30 s.)	✓ (1 min)	✓ (1 min)
Wirksam gegen Coronaviren EN 14476	✓(1 min)	✓ (30 s.)	✓ (1 min)	✓ (1 min)
Begrenzt viruzid PLUS EN 14476 (Behüllte Viren + Rota, Adeno- und Noroviren)	-	✓ (3 min)	-	✓(3 min)
Wirksam gegen Rotaviren EN 14476	✓ (30 s.)	-	✓ (30 s.)	✓ (30 s.)

Wirksam gegen Adenoviren EN 14476	-	✓ (3 min)	-	✓ (3 min)
Wirksam gegen Noroviren EN 14476	-	niedrige Belastung: 1 min hohe Belastung: 3 min"	-	niedrige Belastung: 1 min hohe Belastung: 30 s.
Viruzid EN 14476 (Behüllte und unbehüllte Viren)	-	-	-	-
Wirksam gegen Polioviren EN 14476	-	-	-	-
Wirksam gegen Papova/SV40 - Viren EN 14476	✓ (2 min)	-	✓ (2 min)	-
Bakterizid EN 13727	✓ (1 min)	✓ (1 min)	✓ (1 min)	✓ (1 min)
Levurozid EN 13624	-	✓ (1 min)	✓ (1 min)	✓ (1 min)
Tuberkulozid EN 14348	-	✓ hohe Belastung: 1 min; niedrige Belastung: 30 s.	-	✓ (30 s.)
Fungizid EN 13624	-	-	-	-
PRODUKTEIGENSCHAFTEN				
Alkoholisch	-	✓	-	✓
Alkoholfrei	✓	-	✓	-
Parfümfrei	✓	✓	✓	✓
EINSATZBEREICH				
Anwendungsgebiete	Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichem medizinischen Inventar und Flächen aller Art. Schnelldesinfektion und Reinigung von nichtinvasiven alkoholempfindelichen Medizinprodukten.	Schnelldesinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar und Flächen aller Art, vorwiegend in patientennaher Umgebung. Schnelldesinfektion und Reinigung von nichtinvasiven Medizinprodukten, insbesondere auch für empfindliche Flächen von Medizinprodukten.	Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichem, medizinischen Inventar und Flächen aller Art. Schnelldesinfektion und Renigung von alkoholempfindlichen nichtinvasiven Medizinprodukten.	Schnelldesinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar und Flächen aller Art, vorwiegend in patientennaher Umgebung. Schnelldesinfektion und Reinigung von nichtinvasiven Medizinprodukten, insbesondere auch für empfindliche Flächen von Medizinprodukten.
Empfehlungsbereich				
Wo genau?	Wartezimmer, Sprechzimmer, Patientenzimmer	Sprechzimmer, Patientenzimmer, Lebensmittelbereich und Küche, etc.	Wartezimmer, Sprechzimmer, Patientenzimmer	Sprechzimmer, Patientenzimmer, Lebensmittelbereich und Küche, etc.

INSTRUMENTENDESINFEKTION

Dr. Schumacher

ALLGEMEINE INFORMATIONEN		
Artikelname	**PERFEKTAN® TB**	**DESCOTON FORTE**
Bild		
Hygienelevel	**PREVENT LEVEL**	**PROTECT LEVEL**
Artikelnummer	00-122-010E5 (1 l) 00-122-020E5 (2 l) 00-122-050E5 (5 l)	00-101-010 (1L) 00-101-050 (5L)
Zusammensetzung	100 g Lösung enthalten: 3,75 g Cocospropylendiaminguanidindiacetat, 5,63 g Didecyloxethylmethylammoniumpropionat. Enthält: 5 -15 % nichtionische Tenside, Desinfektionsmittel, Duftstoffe.	100 g Lösung enthalten: 7,6 g Methanal, 4,5 g Glutaral, Enthält: 5-15 % nichtionische Tenside, Duftstoffe.
Produktstatus	Medizinprodukt Klasse IIb gemäss MDD/MDR	Medizinprodukt Klasse IIb gemäss MDD/MDR
WIRKUNGSSPEKTRUM & EINWIRKZEITEN		
Anwendungsempfehlung zur Instrumentendesinfektion: Bakterizid, levurozid VAH / EN	3% - 15 min (hohe Belastung) 2% - 30 min (hohe Belastung) 1% - 60 min (hohe Belastung)	3% - 15 min (hohe Belastung) 3% - 30 min (hohe Belastung) 2% - 60 min (hohe Belastung)
Anwendungsempfehlung zur Instrumentendesinfektion: (tuberkulozid)	-	3% - 30 min (hohe Belastung) 2% - 60 min (hohe Belastung)
Anwendungsempfehlung zur desinfizierenden Reinigung im Ultraschallbad: Bakterizid, levurozid DGHM/VAH	hohe Belastung: 1 % - 5 min	-
Instrumentendesinfektion im Seuchenfall gemäss IfSG	-	5% - 60 min 3% - 120 min
Begrenzt viruzid RKI/DVV (inkl. HBV/HIV/HCV)	2% - 15 min 1% - 30 min	1% - 15 min
Wirksam gegen Adenoviren EN 14476	-	0,5 % - 60 min
Wirksam gegen Noroviren EN 14476	-	-

Wirksam gegen Noroviren EN 17111	-	-
Viruzid EN 14476 & EN 17111 (Behüllte und unbehüllte Viren)	-	2% - 60 min
Wirksam gegen Polioviren RKI/DVV	-	4% - 30 min 2% - 60 min
Wirksam gegen Polioviren EN 14476	-	niedrige Belastung: 2% - 60 min
Wirksam gegen Papova-/Polyomaviren RKI/DVV	2% - 30 min 1% - 60 min	4% - 30 min 1% - 60 min
Wirksam gegen Hepatitis A Viren RKI/DVV	-	6% - 120 min
Bakterizid EN 13727	niedrige Belastung: 0,25 % - 5 min hohe Belastung: 1.5 % - 5 min ; 1 % - 15 min	-
Bakterizid EN 14561	niedrige Belastung: 0,25 % - 5 min hohe Belastung: 2 % - 5 min ; 1 % - 15 min	-
Bakterizid EN 1276	niedrige Belastung: 0,25 % - 5 min	-
Levurozid (Candida albicans) EN 13624	niedrige Belastung: 0,50 % - 5 min hohe Belastung: 1 % - 15 min	niedrige Belastung: 3% - 15 min ; 2% - 30 min ; 2% - 60 min
Levurozid (Candida albicans) EN 14562	2 % - 15 min 1 % - 30 min	-
Levurozid (Candida albicans) EN 1650	niedrige Belastung: 0,25 % - 5 min	-
Tuberkulozid (M. terrae) EN 14348	niedrige Belastung: 5% - 60 min	hohe Belastung: 3% - 30 min ; 2% - 60 min
BESONDERHEITEN		
Geruchsarm	✓	-
Materialschonend	✓	✓
Korrosionschutz	✓	✓
EINSATZBEREICH		
Anwendungsgebiete	Ideal zur desinfizierenden, nicht fixierenden Reinigung von Instrumenten und Dentalinstrumenten. Zum Einsatz im Ultraschallbad geeignet.	Zur manuellen Schlussdesinfektion von medizinischen Instrumenten, flexiblen und starren Endoskopen.
Empfehlungsbereich	HEALTHCARE	HEALTHCARE
Wo genau?	Krankenkäuser (OP), Arztpraxen	Krankenkäuser (OP), Arztpraxen

weita

Weiter denken.
Nachhaltig handeln.

Nachhaltigkeit bedeutet für uns langfristige und zuverlässige Partnerschaften. Wir lieben den Dialog und sehen unseren Mehrwert darin, nicht nur nachhaltige Produkte anzubieten – sondern gemeinsam mit unseren Kunden zukunftsorientierte, ressourcenschonende Gesamtkonzepte zu erarbeiten und umzusetzen.



Weita AG · Nordring 2 · CH-4147 Aesch · T +41 61 706 66 00 · info@weita.ch · www.weita.ch